

USE UN LENGUAJE NORMALIZADOR PARA EXPLICAR LA IMPORTANCIA DE RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL VPH A LOS CLIENTES ADOLESCENTES Y A SUS PADRES O TUTORES.



La vacuna contra el VPH es prevención: protege contra seis tipos de cáncer.

RECOMENDACIONES DE LOS CDC

- Alrededor del 80 % de las personas contraen una infección por VPH durante la vida. Los CDC recomiendan la vacunación rutinaria contra el VPH de todos los niños de 11 a 12 años (la vacuna se puede administrar desde los 9 años). Se ha comprobado que recibir la vacuna antes de los 14 años es más eficaz contra infecciones que causan seis tipos de cáncer, y se necesitan sólo dos dosis.
- Si la vacunación comienza a los 15 años o después, se necesitan tres dosis.

USE UN LENGUAJE NORMALIZADOR PARA EXPLICAR Y ADMINISTRAR VACUNAS MÚLTIPLES EN LA MISMA VISITA A UN ADOLESCENTE, INCLUSO LA VACUNA CONTRA EL VPH.

Hoy, a su adolescente le toca recibir tres vacunas importantes que protegen contra la meningitis, el tétanos y seis tipos de cáncer causados por el VPH. Le vamos a dar esas inyecciones al final de la visita. ¿Tiene alguna pregunta?



RECOMENDACIONES DE LOS CDC

- Utilice un enfoque combinado, recomiende la vacuna contra el VPH de la misma manera y el mismo día en que le recomiende otras vacunas a un adolescente.

Esta hoja de asistencia laboral ha recibido las subvenciones FPTPA006030 y FPTPA006028-04-00 de la Oficina de Asuntos de la Población (Office of Population Affairs). Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La mención de nombres comerciales, prácticas u organizaciones no implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.